

# Instituto de Cirugía Estética y Plástica

## facial

### Los pacientes preguntan al Dr. Mayo

#### **- Tengo mucho complejo de mi nariz desde pequeña, ¿en que consiste la cirugía?**

La operación se denomina Rinoplastia y consiste en modificar la forma y dimensiones de la nariz, adaptándola a la fisionomía de la cara con el fin de obtener un resultado natural y que la persona se encuentre favorecida con el cambio de aspecto. Es muy importante que tengas una entrevista con un Cirujano Plástico titulado y que sea él personalmente el que te explore y comente contigo los posibles cambios. Un consejo, huye de aquellos que te ofrezcan la intervención fuera de un hospital, o sin anestésico. No se te ocurra aceptar la inyección de productos de relleno permanentes en la nariz puesto que no existe la certeza de una buena evolución con el tiempo y no es posible extraerlos una vez inyectados. Otro consejo, que el cirujano que te informó sea el que te opere y te revise en consulta. Lamentablemente el comercio sin escrúpulos se está poniendo de moda en nuestra especialidad, perdiéndose por completo el trato personal con el cirujano que merece todo paciente.

#### **- Tengo mucha tripita, pero quiero quedarme embarazada de nuevo. ¿Me puedo hacer una liposucción? ¿Debo esperar hasta tener un segundo hijo?**

La liposucción dará un buen resultado si tienes una piel de buena calidad, sin flacidez. Es posible tener embarazos posteriores y los acúmulos de grasa no se van a reproducir. Cuanto más joven eres, tu piel responderá mejor a la liposucción.

#### **- Me han hablado de una operación por la cual se puede corregir la forma de mis orejas. ¿Se puede hacer en un niño?**

La otoplastia o cirugía Plástica de las orejas, es la operación de cirugía estética más frecuente entre la población infantil. Los niños con deformidades en las orejas suelen sufrir burlas por parte de sus compañeros de colegio, lo que les origina gran sufrimiento psicológico. Se realiza con anestesia general en niños a partir de 6 años. En adolescentes se puede realizar con anestesia local igual que con los adultos.

